INDONESIAN JOURNAL OF
**CLINICAL PATHOLOGY AND
MEDICAL LABORATORY**

Majalah Patologi Klinik Indonesia dan Laboratorium Medik

Susunan Pengelola Jurnal Ilmiah Patologi Klinik Indonesia
(*Indonesian Journal of Clinical Pathology and Medical Laboratory*)
Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia Masa Bakti 2013–2016
(surat keputusan pengurus pusat PDSPATKLIN Nomor 008/PP-PATKLIN/III/2014)

Pelindung:

Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia

Ketua:

Puspa Wardhani

Wakil Ketua:

Maimun Zulhaidah Arthamin

Sekretaris:

Dian Wahyu Utami

Bendahara:

Bastiana Bermawi

Anggota:

Osman D. Sianipar

Penelaah Ahli:

Riadi Wirawan, AAG. Sudewa, Rahayuningsih Dharma, Mansyur Arif

Penelaah Pelaksana:

Prihatini, July Kumalawati, Ida Parwati, Tahono, Krisnowati, Nurhayana Sennang Andi Nanggung, Aryati,
Purwanto AP, Jusak Nugraha, Sidarti Soehita, Maimun Zulhaidah Arthamin, Endang Retnowati,
Edi Widjajanto, Budi Mulyono, Adi Koesoema Aman, Uleng Bahrin, Ninik Sukartini,
Kusworini Handono, M. Yolanda Probahoedoso, Rismawati Yaswir

Berlangganan:

3 kali terbit per tahun

Anggota dan anggota muda PDSPATKLIN mulai Tahun 2011 gratis setelah melunasi iuran

Bukan Anggota PDSPATKLIN: Rp 175.000,-/tahun

Uang dikirim ke alamat:

Bastiana Bermawi dr, SpPK

Bank Mandiri KCP SBY PDAM No AC: 142-00-1079020-1

Alamat Redaksi:

d/a Laboratorium Patologi Klinik RSUD Dr. Soetomo Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo 6–8 Surabaya.
Telp/Fax. (031) 5042113, 085-733220600 E-mail: majalah.ijcp@yahoo.com; jurnal.ijcp@gmail.com
Website: <http://www.indonesianjournalofclinicalpathology.or.id>

Akreditasi No. 66b/DIKTI/KEP/2011

INDONESIAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY AND MEDICAL LABORATORY

Majalah Patologi Klinik Indonesia dan Laboratorium Medik

DAFTAR ISI

PENELITIAN

Angka Banding Netrofil/Limfosit di Populasi Dewasa Muda (<i>Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Young Adults</i>) Arie Yanti, Uleng Bahrun, Mansyur Arif	105-108
Phosphatidylinositol -3kinase (PI3K) di Perbenihan Adiposit yang Dipajan Glukosa Tinggi dengan Retinol { <i>The Enzyme Phosphatidylinositol -3Kinase (PI3K) in Adipocyte Culture Exposed by High Glucose Related with Retinol</i> }	
Novi Khila Firani, Bambang Prijadi	109-113
Penilaian Uji Troponin I dengan <i>Point of Care Testing</i> (<i>Evaluation of Troponin I Assay with Point of Care Testing</i>) Sheila Febriana, Asvin Nurulita, Uleng Bahrun	114-118
Perbandingan Nilai Diagnostik IgE Spesifik Tungau Debu Rumah, Metode ELISA dan Immunoblot pada Rinitis Alergi (<i>Diagnostic Value Comparison of Specific IgE House Dust Mite, ELISA and Immunoblot Methods in Allergic Rhinitis</i>) Janti Tri Habsari, Aryati, Dwi Reno Pawarti	119-126
<i>Heart Fatty Acid Binding Protein</i> Sebagai Petanda Biologis Diagnosis Sindrom Koroner Akut (<i>Heart Fatty Acid Binding Protein Can be a Diagnostic Marker in Acute Coronary Syndromes</i>) Ira Puspitawati, I Nyoman G Sudana, Setyawati, Usi Sukorini	127-132
Permintaan Darah Persiapan Tindakan Bedah di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo (<i>Blood Demand for Surgery Preparation at Dr. Wahidin Sudirohusodo General Hospital</i>) Herlinah, Rachmawati Muhiddin, Mansyur Arif	133-136
CD4+ dan CD8+ Interferon Gamma Tuberkulosis Paru Aktif dan Tuberkulosis Laten (<i>Interferon Gamma Expression of CD4+ and CD8+ between Active Pulmonary Tuberculosis and Latent Tuberculosis</i>) Betty Agustina Tambunan, John Wiwin, Jusak Nugraha, Soedarsono	137-140
Interleukin-4 dan Interferon Gamma di Nefritis Lupus: Hubungan Aktivitas Penyakit Serta Kekambuhan (<i>Interleukin-4 and Interferon Gamma in Lupus Nephritis: Correlation with Disease Activity and Flare Up</i>) Torajasa Achamar, Dany Farida, Hani Susianti, Kusworini Handono, Ati Rastini, R.I, I Putu A.S, Atma Gunawan, Handono Kalim	141-146
RDW, Jumlah Trombosit dan RPR dengan Indeks FIB-4 di Hepatitis C (<i>RDW, Platelets and RPR with FIB-4 Index in Hepatitis C</i>) Yenny Yulianti, Banundari Rachmawati	147-150

Protein Rekombinan 38 KDA Mycobakterium Tuberculosis dapat Mengimbas Pembuatan Interleukin-2 dan Interferon- γ Limfosit T di Kultur Sel Mononuklear Darah Tepi (<i>The 38 KDA Recombinant Protein of Mycobacterium Tuberculosis can Induce the Synthesis of Interleukin-2 and Interferon-γ T Lymphocytes in Peripheral Blood Mononuclear Cell Culture</i>) Maimun Z Arthamin, Singgih Pujo Wahono, Antiek Primardianti, Ati Rastini, Tri Wahyu Astuti, Tri Yudani Mardining Raras, Francisca S Tanoerahardjo	151–157
Rancangan Primer Spesifik Gen <i>Macrophage Mannose Receptor</i> (MMR) untuk <i>Polymerase Chain Reaction</i> (PCR) dan <i>Sekuensing Deoxyribo Nucleic Acid</i> (DNA) { <i>Macrophage Mannose Receptor Gene</i> (MMR) <i>Specific Primer Design for Polymerase Chain Reaction</i> (PCR) and <i>Deoxyribonucleic Acid</i> (DNA) <i>Sequencing</i> } Yani Triyani, Nurizzatun NaFsi, Lelly Yuniarti, Nanan Sekarwana, Endang Sutedja, Dida Ahmad Gurnida, Ida Parwati, Bacht Alisjahbana	158–162
Analisis <i>King's Score</i> di Penyakit Hati Kronis Berdasarkan Fibroscan (<i>Analysis of King's Score in Chronic Liver Disease Based on Fibroscan</i>) Wira, Amaliyah T. Lopa, Ibrahim Abdul Samad	163–167
Kadar <i>Surfactant Protein-D</i> Serum pada Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronis Berkebahayaan Kambuhan Rendah dan Tinggi (<i>Serum Surfactant Protein-D Level in High and Low Risk of Exacerbation Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients</i>) Dewi Nurhayati, Ida Parwati, Tiene Rostini, Arto Yuwono	168–175
Identifikasi Mutasi H63D Gen HFE pada Kelainan HBE (<i>Identification of H63D HFE Gene Mutation in HBE Disorder</i>) Yanuarita Tursinawati, Nyoman Suci Widyastiti, Moedrik Tamam	176–181
Anti-HIV dan Subtipe HIV pada Pasien Hemodialisis (<i>Anti-HIV and HIV Subtype in Hemodialysis Patients</i>) Retno Handajani, Mochammad Thaha, Mochamad Amin, Citrawati Dyah Kencono WuNgu, Edhi Rianto, Pranawa	182–186
Kenasaban Fosfat Serum, C-Reaktif Protein dan Fetuin A di Pasien Ginjal Tahap Akhir dengan Hemodialisis (<i>Correlation of Serum Phosphate, CRP and Fetuin A in End Stage Renal Disease Patients on Hemodialysis</i>) Indranila KS, Heri Winarto, Purwanto AP	187–193
TELAAH PUSTAKA	
<i>Maldi-Tof dan Seldi-Tof Mass Spectrometry</i> dengan <i>Throughput</i> Tinggi untuk Analisis Proteomik Profil Protein dari Petanda Biologis (<i>Maldi-Tof and Seldi-Tof Mass Spectrometry with High Throu Ghput for Proteomic Analysis of Protein Profiling of Biomarker</i>) Trinovia Andayaningsih, Siti Muchayat P	194–199
LAPORAN KASUS	
Ketoasidosis Diabetik di Diabetes Melitus Tipe 1 (<i>Ketoacidosis Diabetic in Type 1 Diabetes Mellitus</i>) Zuhrinah Ridwan, Uleng Bahrn, Ruland DN Pakasi R	200–203

Ucapan terimakasih kepada penyunting Vol. 22 No. 2 Maret 2016

Riadi Wirawan, Adi Koesoema Aman, Purwanto AP, Sidarti Soehita, Ninik Sukartini, Prihartini, Kusworini Handono, Uleng Bahrn, Aryati, Budi Mulyono, AAG. Sudewa

PENELITIAN

PHOSPHATIDYLINOSITOL -3KINASE (PI3K) DI PERBENIHAN ADIPOSIT YANG DIPAJAN GLUKOSA TINGGI DENGAN RETINOL

{The Enzyme Phosphatidylinositol -3Kinase (PI3K) in Adipocyte Culture Exposed by High Glucose related with Retinol}

Novi Khila Firani¹, Bambang Prijadi²

ABSTRACT

Retinol is one of the active forms of vitamin A. In the previous study, it was known that retinol level in serum of DM patient was lower than in healthy people, which correlated with an increase of the glucose levels in these patients. The importance of retinol in insulin signaling mechanisms that play a role in the pathogenesis of DM is still unknown. One of the components that play a role in insulin signaling on adipocytes is phosphatidylinositol-3 kinase (PI3K), which encourages the translocation of glucose transporter-4 (GLUT4) to the cell surface. The aim of this study was to know the importance of retinol therapy in the levels of PI3K enzyme on visceral adipocyte culture with high glucose exposure (25 mM) as a model of DM in vitro by determination method. Retinol therapy was given at a dose of 0.1 μ M, 1 μ M, and 10 μ M. Measurement of PI3K level was done by ELISA method. The mean (SD) levels of PI3K enzyme were 1.91 (0.27), 0.94 (0.15), 1.98 (0.22), 1.69 (0.81), 2.04 (0.16) ng/mL respectively, for adipocyte cultures exposed to 5mM glucose (as a physiological condition), 25mM glucose, and 25mM glucose concentration with doses of retinol therapy 0.1 μ M, 1 μ M and 10 μ M. The results of this study indicated that high glucose exposure (25 mM) decreased the level of PI3K compared with adipocyte's culture on 5 mM glucose exposure. Retinol therapy with a dose of 0.1 μ M, 1 μ M and 10 μ M on adipocyte culture exposed with high glucose could increase the levels of PI3K.

Key words: Phosphatidylinositol-3 kinase, adipocyte culture, high glucose exposure, retinol

ABSTRAK

Retinol merupakan salah satu bentuk aktif vitamin A. Dalam kajian sebelumnya diketahui bahwa tingkat serum retinol di pasien Diabetes Melitus (DM) lebih rendah daripada orang sehat dan berhubungan dengan peningkatan tingkat glukosa darah. Peran retinol dalam mekanisme pengisyratan insulin di patogenesis DM belum diketahui. Salah satu komponen yang berperan dalam pengiriman isyarat insulin di adiposit, yaitu enzim phosphatidylinositol-3kinase (PI3K), yang mendorong perpindahan *glucose transporter-4* ke permukaan sel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh retinol terhadap tingkat enzim PI3K di perbenihan adiposit dalam rongga perut (viseral) dengan pajanan glukosa tinggi (25 mM) sebagai model DM secara in vitro dengan mencari penjelasannya. Retinol diberikan dengan dosis 0,1 μ M, 1 μ M dan 10 μ M. Pengukuran tingkat PI3K dilakukan dengan metode ELISA. Rerata (SB) tingkat enzim PI3K adalah 1,91 (0,27), 0,94 (0,15), 1,98 (0,22), 1,69 (0,81), 2,04 (0,16) ng/mL secara berturutan di perbenihan adiposit yang dipajan glukosa 5 mM (kondisi fisiologis), glukosa 25mM, serta pajanan glukosa 25 mM dengan pengobatan retinol dosis 0,1 μ M, 1 μ M dan 10 μ M. Telitian ini menunjukkan bahwa di perbenihan adiposit dengan pajanan glukosa tinggi (25mM) menyebabkan tingkat enzim PI3K menurun, dibandingkan dengan yang tingkat enzim PI3K di adiposit pajanan glukosa 5 mM. Pemberian obat retinol dosis 0,1 μ M, 1 μ M dan 10 μ M di perbenihan adiposit yang dipajan glukosa tinggi dapat meningkatkan tingkat enzim PI3K.

Kata kunci: Phosphatidylinositol-3kinase, perbenihan adiposit, pajanan glukosa tinggi, retinol

PENDAHULUAN

Diabetes Melitus (DM) tipe 2 merupakan penyakit degeneratif yang dapat menyebabkan kematian akibat berbagai komplikasi yang ditimbulkan. Setiap 10

detik diperkirakan ada satu orang yang meninggal karena DM.¹ Kejadian penyakit ini di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan pada tahun 2025 Indonesia akan menempati peringkat kelima jumlah

¹ Laboratorium Biokimia-Biomolekuler/Patologi Klinik, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang. E-mail: novikhila@yahoo.com

² Laboratorium Biokimia-Biomolekuler, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya, Malang

penyakit DM tertinggi di dunia dengan pengidap DM sebanyak 12,4 juta jiwa.² Diabetes melitus tipe 2 memiliki patogenesis dengan kompleks yang memicu kondisi gula darah berlebihan (hiperglikemia). Pada awal terdapat resistensi sel target insulin. Resistensi ini dapat berupa jumlah tempat reseptor di membran sel yang responsif terhadap insulin berkurang, atau kelainan pada penerusan isyarat insulin pascareseptor insulin.³ Resistensi insulin menyebabkan *glucose transporter-4* (GLUT4) menjadi tidak terekspresi di membran sel adiposit. Glukosa tidak dapat memasuki jaringan dan bertahan di plasma darah, mengakibatkan kepekatan glukosa plasma menjadi tinggi (hiperglikemia).⁴

Patogenesis terjadi akibat resistensi insulin dimulai dari reseptor insulin yang berada di membran sel. Dalam kondisi normal, insulin yang berikatan dengan reseptor di membran sel merangsang aktivitas tirosin kinase intrinsik, menyebabkan fosforilasi reseptor insulin dan perekrutan molekul yang berperan dalam penerusan isyarat insulin lainnya di intrasel, seperti *insulin receptor substrates* (IRS-1). Peristiwa ini kemudian mendorong jalur biokimiawi yang lebih rumit, antara lain akan terjadi aktivasi enzim *phosphatidylinositol-3-kinase* (PI3K) yang dapat merangsang translokasi GLUT4 ke permukaan sel.⁴ PI3K merupakan salah satu enzim yang bertanggung jawab dalam pengiriman isyarat insulin intrasel. Dalam kondisi resistensi insulin terjadi penurunan enzim PI3K sehingga menyebabkan gangguan pengambilan glukosa oleh sel di jaringan.⁵

Vitamin A atau retinol merupakan molekul yang penting dalam metabolisme intrasel. Pada penelitian sebelumnya diketahui bahwa tingkat serum retinol di pasien DM lebih rendah dibandingkan dengan orang normal, yang bernasab dengan kenaikan tingkat glukosa serta tingkat HbA1c di pasien DM.^{6,7} Peran retinol dalam penerusan isyarat insulin di adiposit belum diketahui, sehingga perlu diteliti pengaruh pemberian retinol di perbenihan adiposit yang dipajan glukosa tinggi sebagai model kondisi DM secara *in vitro*, melalui pengukuran tingkat enzim PI3K sebagai salah satu komponen yang bertanggungjawab dalam pengiriman isyarat insulin di adiposit.

METODE

Penelitian ini merupakan kajian percobaan di laboratorium, menggunakan rancangan *post-test only design with control* di perbenihan adiposit yang diisolasi dari jaringan dalam rongga perut (viseral) tikus. Pengulangan perlakuan dilakukan sebanyak empat kali.

Untuk perbenihan adiposit diperoleh dari hasil isolasi preadiposit dari jaringan adiposis visceral tikus *Rattus norvegicus* galur Wistar jantan yang berusia antara 2–3 minggu. Jaringan serat (fibrosa) dan pembuluh darah terlebih dahulu dibuang, kemudian jaringan adiposis dicuci dengan larutan *Phosphate Buffer Saline* (PBS) sebanyak 10 mL dan selanjutnya dicacah. Suspensi jaringan tersebut diinkubasi dengan 0,2% *Collagenase* jenis I selama 45 menit, suhu 37°C dengan pengocokan. Inkubasi dihentikan dengan menambahkan media perbenihan *Dulbecco's modified eagle medium* (DMEM) yang ditambahkan dengan 15 mmol/L4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid buffer solution (HEPES), 14 mmol/L NaHCO₃, 33 µmol/L biotin, 17 µmol/LD-pantothenate dan 10% fetal bovine serum (FBS). Suspensi sel diputar dengan kecepatan 1500 rpm selama tujuh (7) menit, sehingga didapatkan pelet yang mengandung *fibroblast-like preadipocyte*. Lebih lanjut sel di dresuspensi dengan media perbenihan, kemudian diputar dengan kecepatan 1500 rpm selama tujuh (7) menit. Pelet di dresuspensi lagi dengan media perbenihan. Suspensi sel ditumbuhkan di lempeng perbenihan dengan inkubasi pada suhu 37 °C, 5% CO₂ selama 24 jam. Sel dicuci setiap tiga (3) hari sekali. Setelah mencapai *monolayer*, preadiposit ditumbuhkan dalam media adipogenik, yaitu DMEM/F12 dengan ditambahkan 100 U/mL penisilin dan 100 U/mL streptomisin, serta 66 nM insulin, 100 nM deksametason, 0,5 mM *isobutylmethylxanthine* (IBMX) dan 10 µg/mL transferin, untuk merangsang diferensiasi preadiposit menjadi adiposit yang matur.⁸

Medium perbenihan adiposit dipajankan glukosa dengan kepekatan 5 mM sebagai kondisi fisiologis yang bertugas sebagai pengendali normal. Adiposit dipajankan, juga dengan glukosa berkepekatan 25 mM sebagai kondisi glukosa tinggi yang merupakan model resistensi insulin dalam *in vitro*. Sel diinkubasi selama 24 jam,⁹ kemudian diberi retinol pada media perbenihan adiposit dengan kepekatan retinol 0,1 µM, 1 µM, 10 µM.⁹

Sel adiposit jumlah sekitar 5,0x10² sel, dilisiskan terlebih dahulu dengan 100 µL *lysis buffer* (mengandung 62,5 mM Tris-HCl, pH 6.8, 2% SDS, 10% *glycerol*, 50 mM dithiothreitol, dan 0,1% *bromophenol blue*). Kemudian diukur tingkat enzim PI3K dengan metode ELISA. Sejumlah 50 µL sampel dan larutan baku dimasukkan ke dalam sumuran, diinkubasi selama dua (2) jam kemudian dicuci dengan larutan *wash buffer* 200 µL sebanyak lima (5) kali. Larutan *Biotinylated Phosphatidylinositol-3 kinase II Antibody* ditambahkan sebanyak 50 µL dan diinkubasi selama dua (2) jam. Pencucian dilakukan lagi dengan larutan *wash buffer* 200 µL, selanjutnya ditambahkan

streptavidin-peroxidase conjugate sebanyak 50 μL dan diinkubasi selama 30 menit, kemudian dicuci. Larutan *chromogen substrate* ditambahkan sebanyak 50 μL dan diinkubasi selama 20 menit, kemudian diberi larutan *stop solution* 50 μL . Serapan warna yang terbentuk dibaca menggunakan *microplate reader* dengan panjang gelombang 450 nm.¹⁰

Untuk mengamati morfologi adiposit dilakukan dengan metode pengecatan dengan *Oil Red O*. Sel di setiap perlakuan dilekatkan dengan formalin 10%. Sel dicuci dengan air suling kemudian dikeringkan, lebih lanjut sel ditetesi *propylene glycol* dua (2) kali, masing-masing selama lima (5) menit, kemudian ditetesi pewarna *Oil Red O* selama tujuh (7) menit. Sel dicuci dengan air suling kemudian ditetesi *hematoxylin* selama satu (1) menit. Sel dicuci lagi dengan air suling dan ditunggu sampai kering, setelah itu diamati dengan mikroskop cahaya *Olympus* pada perbesaran 400x.¹¹

Data dianalisis sebagai kelompok dan disajikan dalam bentuk rerata dan simpang baku [rerata (SB)]. Data diuji secara analisis ragam untuk membandingkan perbedaan rerata di setiap kelompok serta diuji regresi-kenasaban untuk mengetahui pengaruh pemberian retinol terhadap tingkat enzim PI3K, dengan nilai $p < 0,05$ kondisi tersebut dapat dianggap bermakna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengamatan morfologi sel di perbenihan adiposit menggunakan pengecatan *Oil red O*. Pada pengamatan morfologi adiposit menggunakan pengecatan *Oil red O* untuk mendeteksi keberadaan tetes lemak (*lipid droplet*), karena secara fisiologis adiposit berperan sebagai tempat menyimpan cadangan tenaga berupa triasilgliserol yang tampak sebagai tetes lemak yang berwarna merah. Sebagai lawan warna (*counterstain*) digunakan *hematoxylin* untuk mewarnai bagian sel lainnya yang tampak berwarna biru (Gambar 1). Di Gambar 1 dibuktikan bahwa sel yang diamati adalah adiposit. Gambaran ini sesuai dengan ciri adiposit yang matur menurut Junqueira,¹² yang menyebutkan bahwa adiposit matur dari jaringan adiposis memiliki bentuk sel bulat dengan tetesan lemak yang sangat besar, sehingga menempatkan inti sel (nukleus) dan sitoplasma di bagian tepi sel.

Ukuran rerata tingkat enzim PI3K di perbenihan adiposit disajikan di Tabel 1. Didasari analisis telitian didapatkan perbedaan bermakna ($p=0,016$) antara rerata tingkat enzim PI3K di perbenihan adiposit yang dipajan glukosa 5 mM sebagai kondisi fisiologis/ glukosa normal dan glukosa 25 mM sebagai yang tinggi, yaitu bersangkutan dengan model kondisi

Gambar 1. Morfologi perbenihan adiposit dengan pengecatan *Oil red O* yang diamati dengan mikroskop cahaya pembesaran 400x.

penyakit DM di *in vitro*. Tingkat enzim PI3K di perbenihan adiposit dengan pajanan glukosa 25 mM lebih rendah dibandingkan dengan tingkat enzim PI3K di perbenihan adiposit glukosa normal.

Pemberian obat retinol di perbenihan adiposit yang mendapat pajanan glukosa tinggi menunjukkan ada peningkatan tingkat enzim PI3K yang nyata dibandingkan dengan tingkat enzim PI3K pada perbenihan adiposit yang dipajan glukosa tinggi tanpa pengobatan retinol, yaitu dengan dosis retinol 0,1 μM ($p=0,011$), 1 μM ($p=0,046$) dan yang 10 μM ($p=0,008$). Pemberian retinol di perbenihan adiposit yang dipajan glukosa 25 mM menyebabkan tingkat enzim PI3K tidak berbeda bermakna ($p=0,994$) dengan yang tingkat enzim PI3K di perbenihan adiposit di kondisi glukosa normal (tingkat glukosa 5 mM). Hasil uji regresi kenasaban menunjukkan ada pengaruh pemberian retinol yang bermakna terhadap peningkatan tingkat enzim PI3K di perbenihan adiposit yang dipajan glukosa tinggi ($r=0,754$; $p=0,009$).

Pada penerusan isyarat insulin di adiposit, peran enzim PI3K sangat penting. Insulin yang berikatan dengan reseptornya di membran sel adiposit akan memicu aktivitas tirosin kinase intrinsik, yang selanjutnya menyebabkan fosforilasi reseptor insulin dan pengerahan molekul lainnya yang berperan dalam penerusan isyarat intrasel, seperti *insulin receptor substrates* (IRS) 1 dan 2. Peristiwa ini lebih lanjut memulai jalur yang lebih rumit dari reaksi fosforilasi dan defosforilasi, antara lain akan terjadi aktivasi enzim PI3K yang dapat mendorong perpindahan

Tabel 1. Rerata (SB) tingkat enzim PI3K di perbenihan adiposit

Kelompok pajanan glukosa di perbenihan adiposit dengan pengobatan retinol	Rerata (SB) tingkat enzim PI3K (ng/mL)
Glukosa 5 mM (pengendali normal)	1,91 (0,27)
Glukosa 25 mM	0,94 (0,15)
Glukosa 25 mM + Retinol 0,1 µM	1,98 (0,22)
Glukosa 25 mM + Retinol 1 µM	1,69 (0,81)
Glukosa 25 mM + Retinol 10 µM	2,04(0,16)

GLUT4 ke permukaan sel untuk pengambilan glukosa dari dalam sel.⁴

Kerja insulin banyak yang bergantung kepada aktivitas enzim PI3K, termasuk dampak perangsangan pengangkutan glukosa, pembuatan glikogen dan dampak penghambatan lipolisis dan transkripsi gen glukoneogenesis.⁴ Kondisi glukosa tinggi di perbenihan adiposit dapat menyebabkan resistensi insulin. Dalam kondisi resistensi insulin terjadi penurunan aktivitas enzim PI3K, sehingga menyebabkan gangguan pengambilan glukosa oleh sel.⁵ Dalam telitian ini diketahui bahwa tingkat enzim PI3K di perbenihan adiposit yang dipajan glukosa tinggi (25 mM) lebih rendah dibandingkan dengan tingkat enzim PI3K di perbenihan adiposit yang dipajan glukosa 5 mM sebagai kondisi glukosa yang normal. Namun belum diketahui apakah terjadi penurunan fosforilasi insulin reseptor dan IRS-1 yang merupakan mediator awal dalam penerusan isyarat insulin intrasel. Telitian yang dilakukan oleh Ying, *et al.*¹³ terkait perbenihan adiposit diketahui bahwa pajanan glukosa 25 mM dapat menyebabkan resistensi insulin. Hal tersebut dibuktikan dengan kejadian penurunan fosforilasi insulin reseptor dan IRS-1.¹³

Tingkat serum retinol ternyata dapat berpengaruh pada timbulnya penyakit DM Hasil meneliti sebelumnya diketahui bahwa tingkat serum retinol di pasien penyakit DM lebih rendah dibandingkan dengan orang yang normal, yang berhubungan dengan peningkatan tingkat glukosa serta HbA1c.^{6,7} Retinol adalah senyawa poli isoprenoid yang mengandung cincin sikloheksenil, yang merupakan salah satu bentuk metabolit dari vitamin A yang memperlihatkan aktivitas biologis. Dari ketiga bentuk metabolit vitamin A yang meliputi retinol, asam retinoat dan retinal, hanya retinol yang memiliki aktivitas penuh vitamin A.¹⁴ Vitamin A di dalam hati disimpan dalam bentuk ester (di dalam) liposit, sebagai molekul kompleks lipoglikoprotein. Untuk pengangkutan ke jaringan, vitamin A dihidrolisis dan retinol yang terbentuk akan berikatan dengan protein pengikat aporetinol atau *Retinol Binding Protein* (RBP). Holo-RBP yang dihasilkan diproses dalam alat *apparatus* golgi dan disekresikan ke dalam plasma. Ketika berada di dalam sel luar hati, retinol terikat dengan protein pengikat

retinol yang terikat sel atau *Cellular Retinol Binding Protein* (CRBP). Jaringan adiposis diketahui juga merupakan tempat penyimpanan vitamin A selain di hati.¹⁵

Selama ini salah satu permasalahan yang menyertai penatalaksanaan diabetes yaitu ketepatan penggunaan pengobatan dalam menurunkan kondisi hiperglikemia dan resistensi insulin. Pengobatan yang digunakan untuk pasien penyakit DM masih terbatas dalam pemberian insulin dan empat jenis agen antidiabetik oral yang bekerja merangsang sekresi insulin pankreas, menurunkan hasilan glukosa hati, memperlambat pencernaan dan penyerapan karbohidrat di usus, atau dengan meningkatkan kepekaan reseptor insulin. Dalam penatalaksanaan tersebut mempunyai efikasi yang masih beragam.¹⁶ Berdasarkan telitian sebelumnya diketahui bahwa tingkat serum retinol di pasien penyakit DM lebih rendah dibandingkan dengan orang yang normal. Oleh karena itu, muncul pemikiran untuk meneliti peran retinol sebagai salah satu pilihan penatalaksanaan penyakit DM.

Telitian ini membuktikan bahwa pemberian retinol di ketiga dosis, yakni 0,1 µM, 1 µM dan 10 µM di perbenihan adiposit yang mendapat pajanan glukosa tinggi (25 mM) menunjukkan ada peningkatan tingkat enzim PI3K yang nyata dibandingkan dengan yang tingkat enzim PI3K di perbenihan adiposit yang dipajan glukosa tinggi tanpa pengobatan retinol, serta tingkat enzim PI3K pada kelompok adiposit yang diberi obat retinol tidak berbeda bermakna dengan yang tingkat enzim PI3K pada perbenihan adiposit dipajan glukosa normal (5 mM). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian retinol di kondisi glukosa tinggi dapat mengimbas peningkatan tingkat enzim PI3K, yang selanjutnya diharapkan dapat menurunkan resistensi insulin di adiposit di kondisi glukosa tinggi.

Peran retinol dalam meningkatkan tingkat enzim PI3K pada penelitian ini diduga melalui isyarat yang melibatkan CRBP. Protein pengikat vitamin A intrasel terdapat dua jenis, yaitu *Cellular Retinol-Binding Protein* (CRBP) dan *Cellular Retinoic Acid-Binding Protein* (CARBP). *Cellular retinol-binding protein* berperan dalam perpindahan retinol dari membran plasma ke tempat pengikatan khusus untuk retinol dalam inti sel di beberapa komponen kromatin. Mekanisme yang

tepat bagaimana retinol mempengaruhi metabolisme di dalam inti sel, pengaturan penampakan genom dan pengimbasan diferensiasi di jaringan adiposis masih dalam penyelidikan. Setelah pengikatan retinol oleh CRBP, selanjutnya zat tersebut diangkut ke dalam sel dan terikat dengan protein di nukleus. Di dalam nukleus, retinol mungkin terlibat dalam pengendalian ekspresi gen tertentu,¹⁴ diduga zat tersebut juga terlibat dalam pengendalian pembuatan enzim PI3K di adiposit, tetapi dugaan ini masih perlu dibuktikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Pajanan glukosa tinggi (25 mM) di perbenihan adiposit menyebabkan penurunan tingkat enzim PI3K dibandingkan dengan yang dipajan glukosa 5 mM sebagai kondisi fisiologis. Pengobatan retinol dosis 0,1 μ M, 1 μ M, dan 10 μ M di perbenihan adiposit yang dipajan glukosa 25 mM diketahui dapat meningkatkan tingkat enzim PI3K. Perlu dibuktikan lebih lanjut mengenai peranan retinol dalam pengendalian ekspresi gen di adiposit, khususnya yang terlibat dalam pengendalian pembuatan enzim PI3K.

DAFTAR PUSTAKA

1. WHO South-East Asia Region Prevalence Data. http://www.who.int/diabetes/facts/world_figures/en/index5.html. [cited November, 2009].
2. Suyono. Waspada Resistensi Insulin Pasien DM Tipe 2. http://www.majalah-farmacia.com/rubrik/one_news.asp. (accessed August 17, 2006).
3. Srinivasan K, Visvanad B, Asrat L, Kaul CL, Ramarao P. Combination of High Fat Diet Fed and Low Dose Streptozotocin Treated Rat: A Model for Type 2 Diabetes and Pharmacological Screening. *Pharmacological Research*, 2005;52 (4): 313-320.
4. Powers AC. Diabetes mellitus. *Harrison's Principles of Medicine* 16th Ed., New York, McGraw-Hill's, 2005; 323-330.
5. Nadler ST, Stoeckl JP, Rabaglia ME, *et al*. Normal Akt/PKB with reduced PI3K activation in insulin resistant mice. *Am J Physiol Endocrine Metab*. 2001; 281(6): E1249-54
6. Zienab MO, Anhar MG, Hala MH, *et al*. Association between retinol metabolism and diabetic retinopathy. *Pol. J. Food Nutr. Sci*. 2004; 13(4): 391-396.
7. Usoro CA, Echeji DC, Usoro IN and Nsonwu AC. Effect of Glycaemic Control on Serum Retinol and Beta Carotene Levels in Type 2 Diabetics in Calabar, Nigeria. *Mal J Nutr*. 2006; 12(1): 55-65.
8. Indra MR, Satuman, Widodo E. Optimalisasi proliferasi dan diferensiasi sel adiposit tikus. Malang, Laboratorium Ilmu Faal Fakultas Kedokteran Unibraw. 2005; 61.
9. Thiagarajan B and Valivittan K. Effect of all-trans retinol on in vitro development of preimplantation buffalo embryos. *Animal* 2009; 3(3): 385-392.
10. Instruction for use. Abcam Phosphatidylinositol-3 kinase ELISA kit. 2009; 1-2.
11. Gregoire F, Smas CM, and Sul HS. Understanding Adipocyte Differentiation. *Physiological Reviews*. 1998; 78(3): 783-809.
12. Junqueira LC and Carneiro J. Basic Histology, Text and Atlas. 11th Ed., Singapore, McGraw-Hill, 2005; 25-29.
13. Ying L, Berg AH, and Iyengar P. The Hyperglycemia-induced Inflammatory Response in Adipocytes. The Role of Reactive Oxygen Species. *The Journal of Biological Chemistry*. 2005; 280(6): 4617-4626
14. Mayes PA. Vitamin A. *Harper's Review Biochemistry*, 26th Ed., New York, McGraw-Hill Company, 2003; 482-483.
15. Wei S, Lai K, Patel S, Piantadosi R, Shen H, Colantuoni V, Kraemer FB, and Blazer WS. Retinyl Ester Hydrolysis and Retinol Efflux from BFC-1b Adipocytes. *The Journal of Biological Chemistry*. 1997; 272(22): 14159-14165.
16. Executive Summary. Comparative Effectiveness and Safety of Oral Diabetes Medications for Adults with Type 2 Diabetes. <http://www.effectivehealthcare.ahrq.gov/repFiles/OralFullReport.pdf> (accessed April 1, 2012).